








Gibbula (*Forskalena*) *fanulum* (Gmelin, 1791)

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987
Superfamilia	Trochoidea Rafinesque, 1815
Familia	Trochidae Rafinesque, 1815
Subfamilia	
Genus	<i>Gibbula</i> Risso, 1826 ex Leach ms.
Subgenus	(<i>Forskalena</i>) Iredale, 1918
specie	<i>fanulum</i> (Gmelin, 1791) [Trochus]
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	<p>= <i>Turbo aegyptius</i> Gmelin, 1791 ! <i>Monodonta aegyptiaca</i> Lamarck, 1822 -- sensu Payraudeau, 1826 = <i>Trochus tuberculatus</i> Risso, 1826 = <i>Trochus undulatus</i> Risso, 1826 = <i>Trochus fanulum</i> var. <i>albosordida</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 = <i>Trochus fanulum</i> var. <i>rubra</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884 = <i>Trochus fanulum</i> var. <i>varia</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884</p>
Descrizione	<p>Di piccola taglia, abbastanza spessa, robusta, con spira conica piuttosto elevata, di altezza pressoché pari alla larghezza, ad anfratti rigonfi e sutura ben incisa. Nella porzione mediana dell'ultimo anfratto, soprasuturale nei precedenti, si trova una netta depressione caratteristica della specie. La parte superiore degli anfratti è leggermente convessa e ornata da ottuse costole radiali; la base, anch'essa convessa, è invece ornata da tre, quattro costole spirali e presenta un ampio e profondo ombelico. Peristoma arrotondato, columella arcuata con bordo superiore lievemente riflesso sull'ombelico. Labbro sottile e tagliente, con una piega a metà per la presenza del solco principale dell'ultimo giro. La colorazione è variabile, bianca, grigiastra o marrone, fittamente punteggiata, con grosse macchie radiali marroni o rosse sulla superficie superiore degli anfratti e macchioline marroni, regolarmente distanziate, sulla loro depressione laterale. L'opercolo è corneo, rotondo, a nucleo centrale. Pur possedendo una sola branchia e un solo osfradio all'interno della cavità palliale, l'animale conserva alcuni caratteri di primitività come la contemporanea presenza di due organi escretori e la porzione posteriore dell'intestino che attraversa il ventricolo cardiaco. La radula è ripidoglossa.</p>
Dimensioni	9/20 mm
Area di distribuzione e habitat	<p>È distribuita in tutta la provincia lusitanica, in modo uniforme in tutto il Mediterraneo. Solitamente vive sopra le pietre o gli scogli del piano infralitorale o, talvolta del piano circalitorale.</p>
	
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	Sabelli B., 1994, Conchiglie, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, pp. 500.
Riferimenti on line	www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4561 www.gastropods.com/0/Shell_5850.html
Comparazione	
Note	
Redattore	Scheda di Fabio Daga – aggiornata al 27/05/2007

Riferimenti fotografici:		
		
Foto 1 di Pierluigi Angioi	Foto 2 di Sergio Lazzarotto	Foto 3 di Aldo Marinelli
		
Foto 4 di Claudio Fanelli		